



Обратите внимание

Безопасность рекомендаций отчета зависит от изначального состояния здоровья ребёнка



Данный отчет носит информационный характер, а ДНК-тест не является инструментом для диагностики заболеваний, профилактики, лечения и медицинской реабилитации.



До перехода на питание по результатам анализа ДНК необходима консультация педиатра для исключения противопоказаний к рекомендованному типу питания.



Меню может быть изменено или дополнено квалифицированным эндокринологом, гастроэнтерологом или диетологом с учетом предложенного типа питания на основе анализа ДНК.



Если состояние здоровья вашего ребёнка не позволяет приступить к питанию по ДНК – начинайте постепенный переход под контролем педиатра и квалифицированного диетолога. Если вы заметите у ребёнка любое ухудшение самочувствия на фоне соблюдения питания, необходимо своевременно сообщить об этом лечащему врачу.



XXX XXX

Мужской	возраст 7 лет	рост 122 см	вес 25 кг	ИМТ* 16.8	КФА* 1.2
---------	------------------	----------------	--------------	--------------	-------------

Рекомендуемое количество калорий для здорового снижения веса:

1038 ккал

Рекомендуемое количество калорий для поддержания веса:

1297 ккал

*ИМТ (Индекс Массы Тела) – показатель, который позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста чтобы определить, является ли вес нормальным, недостаточным или избыточным.

**КФА (Коэффициент физической активности) – отношение среднесуточных затрат энергии человека к его затратам в состоянии полного покоя и величине основного обмена.

Генотип

Результаты
генетического
анализа

Ген	Тип	Генотип	Norm / Norm
ADRB2	Gln27Glu	G/G	Mut / Mut
TCF7L2	Intron3	T/T	Mut / Mut
PPARG	Pro12Ala	G/G	Mut / Mut
FABP2	Ala54Thr	G/A	Norm / Mut
HLA-DQ2.2	326C>VT	T/T	Norm / Norm
LCT	Promoter	T/T	Mut / Mut
FADS1	10283T>C	G/G	Mut / Mut
VDR	Bsml	A/A	Mut / Mut
PPARG	Pro12Ala	G/G	Mut / Mut
ACTN3	Argg577Ter	C/C	Norm / Norm
ACE	Intron16	D/D	Mut / Mut
ADRB2	Gly16Arg	G/G	Norm / Norm
ADRB2	Gln(C)27Glu(G)	G/G	Mut / Mut
ADRB3	Trp64Arg	T/C	Norm / Mut

Рацион питания

Пищевые непереносимости

Витамины

Спорт и физические нагрузки



Введение

Вы держите в руках персональный отчет о результатах молекулярно-генетического исследования. Этот документ позволит сформировать и скорректировать пищевые привычки у ребёнка для формирования у него принципов здорового образа жизни. Отчет содержит результаты анализа и теоретическую информацию, которая позволит лучше разобраться в вопросах питания и физической активности вашего ребёнка. Отчет базируется на данных, полученных в результате анализа ДНК и на оценке образа жизни по итогам анкетирования.

Данный отчет не определяет текущее состояние здоровья, он говорит о генетических предрасположенностях к определенным физиологическим состояниям, а также указывает на ряд характерных признаков ребёнка, связанных с питанием и физическими нагрузками. Гены на 40% определяют здоровье человека, 50% зависит от образа жизни человека (привычки, питание, спорт, экологическая среда) и лишь 10% – от целенаправленного оздоровления и лечения.*

Как работает генетика

Ген – участок молекулы ДНК, в котором закодирована информация о биосинтезе конкретной белковой молекулы, выполняющей определённую функцию в организме. Любой человек является носителем двух копий каждого гена, доставшихся ему от отца и матери. Из 20 000 генов мы выбрали для анализа и акцентировали внимание на тех вариантах, которые несут в себе практическую информацию, особенно важную при развитии детского организма.

Исследования ДНК и расшифровка генома человека позволили найти ключ к лечению и профилактике многих заболеваний через питание. На стыке генетики и диетологии появилась наука – нутригенетика. Она изучает особенности влияния продуктов питания на человека. Этому разделу в отчете удалено особое внимание, тип питания основан на анализе генов, от которых зависит индивидуальная реакция организма на те или иные продукты.

* По исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Содержание



Рацион питания

На основе результатов генетического анализа составляются рекомендации по питанию и подбираются варианты меню, подходящие для рациона вашего ребёнка. Также вы узнаете о возможных причинах лишнего веса и рисках развития диабета 2-го типа.

стр. 05



Пищевые непереносимости

Из результатов анализа вы узнаете о наличии предрасположенности к целиакии, непереносимости глютена и лактозы.

стр. 15



Витамины

Вы узнаете о потребностях организма в витаминах D и F, наиболее важных для развития детского организма, и способах его предотвращения с помощью сбалансированного питания.

стр. 21



Уровень физической активности

Вы узнаете о скорости расходования энергетических запасов организма, какие и в каком количестве физические нагрузки рекомендованы ребёнку для здорового физического развития.

стр. 25



Спортивный потенциал

В ДНК заложены врождённые спортивные качества каждого человека. Эта информация поможет выбрать перспективное направление в спорте, снизить риск многих спортивных травм и осознанно найти спортивную секцию для ребёнка.

стр. 27



Рацион питания

Правильное питание с детства – залог здоровой пищеварительной системы и отсутствие проблем с весом. Известно немало случаев, когда неправильное питание ребёнка приводит к лишнему весу, нарушениям работы эндокринной и центральной нервной системы, а также диабету 2-го типа. Необходимо приучать к правильному питанию с детства, так как с самого раннего возраста формируются устойчивые пищевые привычки, которые не только приводят к изменению психологических особенностей пищевого поведения, но и к необратимым изменениям во вторичной структуре ДНК, которые впоследствии могут передаваться следующим поколениям.

По результатам ДНК-анализа специалисты определяют, какой тип питания, какие продукты и в каком количестве нужны ребенку для здорового функционирования организма и нормализации веса. При составлении рациона питания мы уделили внимание генам, которые отвечают за расщепление и усвоение жиров и углеводов, а также предрасположенность к развитию диабета 2-го типа. В результате ДНК-анализа вы узнаете, сколько жиров, углеводов и белков должно быть в рационе ребенка ежедневно, и какие продукты стоит включить в рацион ребёнка, а каких лучше избегать.

Белки

Строительный материал
для мышц

Жиры

Структурные компоненты
клеточных мембран

Углеводы

Основной источник
энергии

Резюме

Для генетического профиля вашего ребёнка оптимальным является:

Низкоуглеводный рацион питания с ограничением насыщенных жиров и профилактикой диабета 2-го типа*

Белки 20-25%

Жиры 20-25%

Углеводы 45-50%

Особенности метаболизма:

Скорость распада углеводов



Усвоемость жиров



Низкая

Средняя

Высокая

Сахарный диабет второго типа



Скорость роста жировых клеток



Низкая

Средняя

Высокая

Результаты ДНК-анализа помогут вам сбалансировать питание ребёнка и скорректировать его рацион, исключив продукты, которые плохо усваиваются организмом, чтобы получать из пищи только полезные для него питательные вещества.

Lambert C. P., Frank L. L., Evans W. J. Macronutrient considerations for the sport of bodybuilding //Sports Medicine. – 2004. – Т. 34. – №. 5. – С. 317-327.

Halton T. L., Hu F. B. The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: a critical review //Journal of the American College of Nutrition. – 2004. – Т. 23. – №. 5. – С. 373-385

Cornelis M. C. et al. TCF7L2, dietary carbohydrate, and risk of type 2 diabetes in US women //The American journal of clinical nutrition. – 2009. – Т. 89. – №. 4. – С. 1256-1262.

Martínez J. A. et al. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu 2-adrenoceptor polymorphism //The Journal of nutrition. – 2003. – Т. 133. – №. 8. – С. 2549-2554.

Pratley R. E. et al. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding protein on responses to dietary fat in humans //Journal of lipid research. – 2000. – Т. 41. – №. 12. – С. 2002-2008.

Robitaille J. et al. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study //Clinical genetics. – 2003. – Т. 63. – №. 2. – С. 109-116.

Genin E. et al. APOE and Alzheimer disease: a major gene with semi-dominant inheritance //Molecular psychiatry. – 2011. – Т. 16. – №. 9. – С. 903.


Sorrensen M. et al. Evidence from case-control and longitudinal studies supports associations of genetic variation in APOE, CETP with human longevity //Age. – 2013. – Т. 35. – №. 2. – С. 487-500

Lai C. Q. et al. Influence of the APOA5 locus on plasma triglyceride, lipoprotein subclasses, and CVD risk in the Framingham Heart Study //Journal of lipid research. – 2004. – Т. 45. – №. 11. – С. 2096-2105.

Белки


Белки – важный структурный и строительный элемент для организма

Результат анализа



Физиологическая потребность в белке:

10-12%




Для снижения веса

20%



Для поддержания веса

15%



При интенсивных физических нагрузках:

20-25%

Влияние на организм

Дефицит:

- Нарушение работы печени
- Атрофия мышц
- Снижение иммунитета
- Депрессия

Избыток:

- Образование камней в почках
- Хрупкость костей
- Отёчность
- Изменение естественного запаха

Рекомендация

Общая рекомендуемая доля белков в вашем рационе должна составлять 12-15 % и содержать разные виды белков.
При интенсивной физической активности возможно увеличение доли белков до 20-25 % от общей калорийности суточного рациона.

Нужно учитывать, что у детей суточная потребность в белке гораздо выше, чем у взрослых. В дошкольном возрасте ребёнку необходимо съедать не менее 2,5 граммов белка на килограмм массы тела. У взрослых же норма составляет 1-1,5 г.

Общая информация

PROFESSIONAL

Белки – органические вещества, важные источники аминокислот. Белки необходимы организму в качестве строительного материала для новых клеток и укрепления имеющихся, они являются антителами к различным инфекциям. Аминокислоты, из которых состоят белки, скрепляются между собой органическими соединениями. В процессе пищеварения, белки сначала распадаются на аминокислоты, которые участвуют в построении собственных белков человека.

Белки обычно делят на два типа, в зависимости от происхождения: животный и растительный. Наиболее полноценным считается животный белок, поскольку в своём составе имеет как заменимые, так и незаменимые аминокислоты. Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме. Их можно получить только из питания.

Включайте в ежедневный рацион ребёнка

Животный, 1 порция на выбор

до 12:00



300 мл молочной сыворотки



3 шт яйца



300 мл кефира или натурального йогурта

Мясной, 1 порция на выбор



150 г куриного филе/индейки



150 г говяжьей печени



150 г говядины, баранины

до 16:00



200 г бобовых (нут, чечевица, горох)



150 г грибов



250 г крупы (гречка, кукурузная крупа, бурый рис)

Растительный, 1 порция на выбор



100 г творога 2-5% жирности



50 г нежирного сыра (бризза, фета, рикотта)



250 мл ряженки или молока

Молочный, 1 порция на выбор



100 г лосося



100 г минтая



150 г кальмаров

В течение дня

Влияние на организм

PROFESSIONAL

Влияние на организм

Белки важны в обмене веществ, но их потребление напрямую не связано с ожирением. Генетика оказывает минимальный вклад на белковый обмен веществ в организме, редкие случаи генетических мутаций диагностируют другими способами. ДНК-тест позволяет определить оптимальную долю белков в рационе на основе информации о метаболизме углеводов и жиров. Доля белков в рационе особенно важна для детей при активном росте организма, а также белок необходим взрослым при занятиях спортом и наборе мышечной массы, так как он является строительным материалом для новых клеток.

Рекомендации

Белки являются важным регулятором аппетита, они быстро утоляют голод и долго сохраняют чувство насыщения. Потребление белков влияет на формирование обмена веществ.

Для стабильного развития ребёнка, количество белка должно составлять от 20 до 30 % суточной калорийности всего рациона.

Это необходимо для здорового роста и развития опорно-двигательной системы. В утреннее время лучше употреблять быстроусвояемый белок, в обед мясной и растительный, а вечером лучше есть долгоусвояемый белок для поддержания обмена веществ во время сна.

Включайте в ежедневный рацион ребёнка

Простые углеводы

Быстро усваиваются организмом, резко повышают уровень глюкозы в крови, чувство насыщения быстро проходит.

В течение дня



15 г сухофруктов (горсть)



1 фрукт / 100-150 г ягод



5 г мёда (чайная ложка)



20 г темного шоколада

Сложные углеводы

Долго усваиваются, вызывают умеренное повышение сахара в крови, обеспечивают длительное насыщение.

В течение дня



200 г крупы в приготовленном виде: гречка, рис, пшено



50 г цельнозерновых макарон*



2 ломтика ржаного хлеба*



150 г крахмалистых овощей: картофель, морковь, репа

Пищевые волокна (клетчатка)

Не расщепляются в организме, но перерабатываются микрофлорой кишечника, нормализуя пищеварение.

В течение дня



150 мл овощного сока



1 овощ: томат, огурец, перец



4 цельнозерновых хлебца*



30 г зелени: петрушка, укроп, шпинат, листья салата

Родители довольно часто вознаграждают детей сладостями за успехи и хорошее поведение. Обычно, это любимые детьми шоколадки, чипсы, конфеты. С точки зрения питания, этого делать не рекомендуется, чрезмерное употребление кондитерских изделий, особенно магазинных, приводит к лишнему весу и кожным заболеваниям. Кроме того организм быстро привыкает к сахару, и у ребёнка формируется зависимость от сладкого. Если хотите побаловать ребёнка сладким, давайте ему фрукты, сухофрукты, мёд.

Влияние на организм

Низкая скорость расходования энергетических запасов на фоне пониженной скорости секреции инсулина в ответ на поступление глюкозы с пищей. Высокая предрасположенность к полноте за счет низкой скорости расходования углеводов, высокая предрасположенность к диабету 2-го типа.

Рекомендация

Рекомендуемое количество углеводов для вашего ребёнка – не более 45% от общего рациона. Количество пищевых волокон рекомендуется увеличить до 40 г. Фрукты, сухофрукты, ягоды – не более 100 г в сутки в первой половине дня, обязательно сочетать их с белковыми продуктами. Сложные углеводы (темные крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, картофель, серый и отрубной хлеб) – не более 200 г в общей сложности. Свежевыжатые и пакетированные соки, сладкие газированные напитки, фруктовые смеси, мёд, сахар и сладости должны быть полностью исключены из рациона. Допустимо использовать натуральные сахарозаменители: стевия, эритрол, инулин. Рекомендуется питьаться не чаще, чем через каждые 2,5–3 ч, оптимальный интервал между приемами пищи 3–4 часа. Суточные ограничения: до 12.00 – фрукты, сухофрукты, ягоды; до 14.00 – сложные углеводы и крахмалистые овощи (картофель, кукуруза); после 14.00 – некрахмалистые овощи (огурцы, томаты, все виды капусты и др.).

*При отсутствии непереносимости глютена.

Рекомендуется консультация специалиста - диетолога.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН FABP2	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ G/A	ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА 51%	ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН PPARG	ВАШ РЕЗУЛЬТАТ G/G	ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА 2%
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ALA56THR	NORMA MUTATION	В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA	ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PRO12ALA	MUTATION MUTATION	В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

Жиры

Жиры – строительный материал для клеточных мембран, энергетическое топливо для организма.

Результат анализа

Предрасположенность к ожирению за счёт жирной пищи в связи с ускоренным ростом жировых клеток.


Усвояемость животных жиров



Скорость роста жировых клеток




Низкая



Общая доля жиров
в рационе
20-25%



Мононенасыщенные
10%



Полиненасыщенные
5%



Насыщенные
5%

Влияние на организм

Дефицит:
Ухудшение состояния кожи и волос
Постоянная слабость
Гормональные нарушения
Нарушения работы нервной системы

Избыток:
Избыточный вес
Сердечно-сосудистые заболевания
Повышенная свёртываемость крови
Нарушение метаболизма

Рекомендация

Рекомендуемая доля жиров для вашего ребёнка составляет 25% от общей калорийности суточного рациона с сокращением животных жиров до 5-7% и исключением трансжирам.

Общая информация

При развитии детского организма жиры играют особую роль, они участвуют в формировании клеток мозга, иммунной и гормональной системах, а также используются организмом как энергетическое топливо. Жиры бывают вредными и полезными. Вредные становятся причиной нарушений работы мозга, обмена веществ, функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Для выявления нарушений жирового обмена обычно проводится биохимический анализ крови. Генетический анализ показывает, подвержен ли ваш ребенок набору лишнего веса за счет употребления жиров.

Самым вредным типом жиров являются трансжиры – это искусственно синтезированные масла. Они дешевые, способны долго храниться и не терять твердую форму даже при комнатной температуре, часто содержатся в магазинных сладостях (пончиках, тортах, печеные), мясных полуфабрикатах, спредах и соусах (майонезе, кетчупе, маргарине). Попадая в организм, они нарушают транспорт питательных веществ через мембранны клеток. В результате ухудшается питание клеток и нарушается работа мозга, что может привести к отставанию в развитии.

Результат анализа: гена FABP2

Повышенная скорость усвоения насыщенных жирных кислот в кишечнике.

Ген FABP2 кодирует белок, который связывает жирные кислоты в кишечнике и способствует их активному транспорту и усвоению. Обладает высоким сродством к насыщенным жирам и обеспечивает захват и транспорт внутрь кровотока. Менее благоприятный вариант гена приводит к повышению усвоемости насыщенных жирных кислот в кишечнике и набору массы тела.

Результат анализа гена PPARG

Низкая скорость роста жировых клеток в ответ на поступление жиров с пищей.


Ген PPARG кодирует белок, который участвует в делении жировых клеток, увеличении их размеров в ответ на появление жиров в кровеносном русле, участвует в развитии атеросклероза. Менее благоприятный вариант гена приводит к усилению накопления жиров внутри жировых клеток и повышению общего уровня холестерина в крови.

Включайте в ежедневный рацион ребёнка

Рекомендуются

Полиненасыщенные жиры

Структурные компоненты органов и тканей, участвуют в иммунном процессе и синтезе гормонов, важны для работы мозга. Нормализуют обмен веществ, не влияют на ожирение



1 ч. л. льняного или
рыжикового масла



30 г семечек
подсолнечника
или тыквы

1 порция



150 г
морепродуктов



200 г
морской рыбы



3,5 г
рыбьего жира

Рекомендуются

Мононенасыщенные жиры

Структурные компоненты клеточных мембран, важный источник энергии, активный элемент обмена веществ, быстро выводятся из жировых клеток.



50 г
орехов (горсть)



30 г
авокадо

1 порция



10 шт
маслин



1 ч. л. ложка
арахисового масла



1 ч. л. ложка
подсолнечного
масла

Ограничить


Насыщенные жиры

Тяжело усваиваются и медленно расщепляются в организме, накапливаются в жировых клетках и формируют жировые запасы. Могут синтезироваться в организме

(Ограничить при предрасположенности к лишнему весу)



70 г мяса жирного
сорта (свинина,
говядина вырезка)



2 яйца

1 порция



30 г
сметаны, молока
или сливок



30 г
мороженного



20 г
сыра высокой
жирности

Полностью исключить

Трансжиры

Искусственный жир, нарушает транспорт питательных веществ в клетки, не выводится из организма

маргарин
спреды
твёрдый
растительный
жир

чипсы
половинки
фаст-фуд
картофель фри

сыры без
холестерина
некоторые
кондитерские
изделия

сухие
концентраты
супов, соусов,
десертов, кремов

Полиненасыщенные жиры, в том числе «хороший» холестерин, особенно важны для формирования клеток мозга. Поэтому в рационе ребёнка в период с рождения и вплоть до полового созревания должно содержаться достаточное количество полезных жиров. Для здорового развития мозга, ребёнок должен получать необходимые для этого питательные вещества из льняного масла, грецких орехов и красных сортов жирной рыбы.

Влияние на организм

Повышенная скорость усвоения в кишечнике насыщенных жирных кислот, поступающих из пищи, низкая скорость роста жировых клеток в ответ на поступление жиров из пищи. Повышенная склонность к набору массы тела за счет поступления жиров из пищи.

Рекомендация

На основе результатов генетического анализа было выявлено, что ваш ребёнок склонен к увеличению веса, если в его рационе присутствуют насыщенные жиры в большом количестве. Рекомендуется снизить потребление жирных видов мяса (свинина, баранина, говяжий жир, сало), мяса-костных бульонов, жирной птицы (утка, гусь, куриная кожа); молочных продуктов и сыров высокой жирности. Полностью исключить трансжиры (майонез, маргарин и др.). Можно употреблять продукты животного происхождения умеренной жирности: мясо (нежирная говядина, кролик, оленина), птица (курица, индейка, перепелка, без кожи и видимого жира), яйца, молочные продукты до 15% жирности.

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.


Рацион питания

Научные исследования последних лет показали, что наследственность влияет на эффективность той или иной диеты. Мы произвели расчеты, чтобы подобрать для вашего ребёнка подходящий рацион питания, обеспечивающий оптимальный обмен веществ, снижение веса и улучшение здоровья.


Далее вам предложены примерное меню, а также расчет количества продуктов, допустимых к употреблению в день. Для получения индивидуальных рекомендаций проконсультируйтесь со специалистом.*

Для генетического профиля ребёнка оптимальным является:


Низкоуглеводный рацион питания



Белки
20%



Жиры
30%



Углеводы
50%

С пониженным содержанием углеводов, преимущественно за счет легкоусвояемых углеводов.

Основу рациона для генотипа ребенка составляет сбалансированное содержание основных питательных элементов (белков, жиров, углеводов) в примерном соотношении*: белки – 20 %, жиры – 30 %, углеводы – 50 %. Это значит, что необходимо ограничить потребление быстрых (легкоусвояемых) углеводов: сахара, изделий из муковысшего сорта, кондитерских изделий, сладких напитков и других продуктов, имеющих высокий гликемический индекс.

Основные рекомендации



Режим питания:

Первый прием пищи – в течение часа после пробуждения, последний – за 2-3 часа до сна. Количество приемов пищи зависит от скорости расходования углеводов (подробнее в разделе «Рацион питания»). Три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин + перекусы на выбор).



Питьевой режим:

Количество свободной жидкости, которое необходимо потреблять ежедневно (преимущественно чистой негазированной воды комнатной температуры) составляет 30 мл/кг. Для снижения веса эффективным считается так называемый «дренажный» питьевой режим, когда следует выпивать 1 стакан воды за 30 мин до еды и 1 стакан через час после еды. Запивать пищу водой и другими жидкостями не рекомендуется.



Способ приготовления:

Отдайте предпочтение блюдам, приготовленным на пару, при помощи мультиварки, запеченым в духовке или в «рукаве». Это позволит сохранить малую калорийность приготовленного блюда. От классического жарения и приготовления еды во фритюре следует отказаться. Допустимо тушение пищи на сковороде без масла с небольшим количеством жидкости под крышкой.



Исключить:

Трансжиры (майонез, маргарин); чипсы, сухарики промышленного изготовления и другие продукты, имеющие в своем составе искусственные пищевые добавки (красители, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы и т. д.), поскольку их потребление вредит здоровью; рафинированный сахар и все продукты, его содержащие; рафинированную муку (высшего сорта) и все изделия из нее.*



Ограничить:

Сладкие фрукты (бананы, виноград, инжир, хурма, дыня) и сухофрукты (финики, изюм, инжир); натуральные подсластители (мед, лукума, сироп топинамбура и др.); белые и желтые крупы (манная, рисовая, кукурузная, пшенная); жареный и толченый картофель; отварные морковь и свеклу, так как гликемический индекс этих овощей после отваривания значительно повышается. Эти продукты можно потреблять в небольших количествах не чаще 1-2 раз в неделю исключительно в первой половине дня.*



Допустимо:

Все виды мяса, птицы, рыбы; морепродукты; молочные продукты, в том числе сыр; сливочное и растительное масло; орехи и семечки; все виды овощей; бобовые; несладкие фрукты; темные крупы (гречневая, овсяная, перловая, булгур, дикий рис, бурый рис и др.); изделия из цельного зерна (хлеб, выпечка, макароны из твердых сортов пшеницы); овощи. Желательно все продукты, богатые углеводами (кроме некрахмалистых овощей) употреблять до 18 ч.*

*Приведенный рацион предназначен для среднестатистического человека с данным генотипом. Калорийность рациона и соотношение БЖУ меню должны и назначаться лечащим врачом, с учетом генотипа, уровня физической активности, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний.

Примерное меню

Завтрак на выбор:

Омлет с зеленью (150 г) и сливочным маслом (10 г), помидор, хлеб зерновой (30 г), чай или кофе (200 г).	Каша овсяная на воде (200 г) со сливочным маслом (10 г) и фруктами (50 г), чай или кофе (200 г).	Каша гречневая рассыпчатая (100 г), сыр (20 г), яйцо, огурец, чай или кофе (200 г).	Хлопья без сахара (30 г), молоко или классический йогурт (200 г), фрукты или ягоды (50 г).	Бутерброды с запеченным мясом или птицей (2 шт.), салат из моркови с яблоком (100 г), заправленный растительным маслом (10 г), чай или кофе (200 г).
---	--	---	--	--

Полдник и ланч:

Стакан йогурта, яблоко.	Ржаные хлебцы (2 шт.) с томатами и сыром.	Творог (100 г) со сметаной (15 г), миндаль (20 г).	Ягоды или фрукты (150 г).	Любые овощи (150–200 г).
-------------------------	---	--	---------------------------	--------------------------

Обед на выбор:

Вегетарианский борщ (250 г), хлеб отрубной (30 г), запеченная рыба (100 г).	Куриный бульон с вермишелью (250 г), курица из супа (100 г).	Уха с рисом (250 г), рыба из супа (100 г).	Гречка отварная (100 г), азу из говядины (100 г), салат из свежих овощей (100 г), заправленный растительным маслом (10 г).	Картофель (100 г), запеченный с курицей (100 г) и чесноком (5 г), салат из моркови и капусты (100 г) с растительным маслом (10 г).
---	--	--	--	--

Ужин на выбор:

Голубцы без риса (150 г) со сметаной (15 г).	Овощи в любом виде (150 г), мясо (100 г).	Стручковая фасоль (100 г), рыба (100 г).	Кальмары (100 г), фаршированные яйцом (150 г).	Салат «Капрезе» (томидоры, базилик, сыр моцарелла, оливковое масло) (100 г), мясо или птица (100 г), зелень (30 г).
--	---	--	--	---

Примерный список основных продуктов на неделю:

	На день	На неделю	
Вода	30 мл/кг		Выпивайте минимум 1,5 литра чистой воды в сутки.
Овощи и зелень	700 г	4900 г	Некрахмалистые овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, цуккини, все виды капусты, баклажаны, свекла, морковь (4400 г). Зелень (500 г)
Фрукты и ягоды	300 г	2100 г	Фрукты: яблоки, груши, апельсины, бананы и др. (1500 г) Ягоды: черника, виноград, клубника, малина (500 г) Сухофрукты: курага, чернослив, изюм, инжир (100 г)
Зерновые и бобовые продукты	250 г	1750 г	Крупы: овсяная, гречневая, перловая (750 г) Бобовые: горох, фасоль, чечевица (800 г) Цельнозерновой хлеб или хлебцы (200 г)
Молочные продукты	300 г	1750 г	Молоко 2,5% (500 г), йогурт (500 г), творог 2,5% (450 г), сметана 10% (200 г), сыр (100 г)
Мясо, птица, рыба, яйца	400 г	2800 г	Мясо: курица, говядина, индейка, кролик (1000 г). Рыба (1000 г) Морепродукты: кальмары, мидии (400 г). Печень (200 г). Яйца 8 шт.
Семена и орехи	20 г	140 г	Орехи: грецкий орех, фундук, миндаль, кешью (80 г) Семена: тыквенные, подсолнечника (60 г)
Масло	10 г	70 г	Льняное, рыжиковое, подсолнечное, оливковое (50 г). Сливочное (20 г)
Напитки	450 мл	3 л	Чай: черный, зеленый, травяной (100 г). Кофе молотый, по переносимости (50 г). Цикорий (100 г)
Сахар и кондитерские изделия	10 г	70 г	Черный шоколад, сладости на основе сахарозаменителей (сукралоза, стевиозид) (70 г)





Пищевые непереносимости

Привередливость в еде не всегда зависит от самих продуктов питания или избалованности. Да, пищевые привычки во многом закладываются еще в детстве, но огромную роль играют и гены. Ученые выяснили, что гастрономические предпочтения заложены именно в них. Многие люди испытывают постоянные проблемы с пищеварением из-за генетической непереносимости злаковых или лактозы, и даже не знают об этом. Важно узнать о предрасположенности к пищевым непереносимостям в раннем возрасте, чтобы вовремя назначить профилактику сопутствующих заболеваний. Невыявленные пищевые непереносимости могут провоцировать замедленное развитие ребёнка и привести к более серьёзным заболеваниям, таким как рахит.

В ДНК-тесте исследуются гены, отвечающие за отдельные химические процессы в организме, которые связаны с использованием, накоплением или расщеплением тех или иных веществ – это позволяет определить, каким образом ваш организм реагирует на эти вещества, в частности на лактозу и глютен.



Глютен

У детей симптомы целиакии более выражены, чем у взрослых. Непереносимость глютена может быть причиной дефицита массы тела и проблем с пищеварением. Обычно симптомы начинают проявляться в возрасте 7-8 месяцев, но иногда могут таиться и до 2-3-х лет. В некоторых случаях непереносимость глютена может протекать в скрытой форме вплоть до взрослого возраста.



Лактоза

В первые годы жизни все младенцы усваивают молоко. Грудное молоко и специальные молочные смеси для первого прикорма являются единственным источником питательных веществ для грудных детей и их организм справляется с их усвоением. Однако у детей с предрасположенностью к непереносимости лактозы к 7-ми годам снижается способность переваривать молоко, а к 14-годам может исчезнуть совсем.

Резюме

Результаты, полученные на основе исследования ДНК, позволяют выявить непереносимость злаковых и молочных продуктов. При наличии риска развития пищевой непереносимости следует исключить потенциально опасные продукты из рациона и обратиться за консультацией к специалисту.

Пищевые непереносимости



Hertzler S. R., Clancy S. M. Kefir improves lactose digestion and tolerance in adults with lactose maldigestion //Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. – 2003. – Т. 103. – №. 5. – С. 582-587.

Jnawali P., Kumar V., Tanwar B. Celiac disease: Overview and considerations for development of gluten-free foods //Food Science and Human Wellness. – 2016. – Т. 5. – №. 4. – С. 169-176.

Bersaglieri T. et al. Genetic signatures of strong recent positive selection at the lactase gene //The American Journal of Human Genetics. – 2004. – Т. 74. – №. 6. – С. 1111-1120.

Vader W. et al. The HLA-DQ2 gene dose effect in celiac disease is directly related to the magnitude and breadth of gluten-specific T cell responses //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2003. – Т. 100. – №. 21. – С. 12390-12395.

Davey G. K. et al. EPIC-Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK //Public health nutrition. – 2003. – Т. 6. – №. 3. – С. 259-268



ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
HLA-DQ2.2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
T/T

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
67%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: GS221

NORMA

NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Глютен

Глютен – вещество из клейковины, входящее в состав злаковых растений

Результат анализа

Низкая чувствительность к глютену.

Непереносимость глютена



Риск целиакии



Низкая

Средняя

Высокая

Влияние на организм

Непереносимость глютена маловероятна. Не выявлена генетическая предрасположенность к развитию целиакии.*

При обнаружении симптомов непереносимости глютена следует проконсультироваться со специалистом

Симптомы непереносимости глютена:

Проблемы с пищеварением

Боль в суставах

Акне

Мигрень

Рекомендация

Ваш ребёнок может употреблять продукты, содержащие глютен: рожь, ячмень, пшеницу, овёс, все крупы и изделия из злаков.

В период дошкольного возраста формируется вся опорно-двигательная система. При явной или «скрытой» целиакии, ребенок теряет кальций, и процессы окостенения могут быть нарушены. Это может привести к сколиозу, рахиту, искривлению конечностей, кариесу.

*За более подробной информацией и рекомендациями обратитесь к специалисту.

Общая информация

Глютен – это группа белков, содержащихся в семенах злаковых растений. Глютен содержится не только в продуктах, изготовленных из злаковых (зерновых) культур, но и может входить в состав некоторых соусов в качестве загустителя. В этом случае, он обычно обозначается как «модифицированный пищевой крахмал» или «гидролизованный белок». Но не у всех организм воспринимает глютен хорошо.

Первые симптомы непереносимости глютена появляются у ребенка через 1-6 месяцев (а иногда и через несколько лет) после введения в его рацион овсяной и манной каши, а также молочных смесей с толокном. Ребенок останавливается в весе, появляются боли в животе, вздутие, частый жидкий стул, психика становится нестабильной. Если на эти симптомы вовремя не обратить внимания, ребенок начинает останавливаться в росте, у него наступает атрофия мышечной ткани, живот сильно вздут при истощенных конечностях. Иммунитет значительно снижается, приводя к частым воспалительным заболеваниям кожи и внутренних органов.

Врожденная непереносимость этого вещества – целиакия. Это аутоиммунное заболевание, которое возникает в результате повреждения ворсинок кишечника продуктами, содержащими глютен.

Результат анализа

Низкая чувствительность иммунной системы к глиадину.

Ген HLA-DQ2 кодирует белок, участвующий в распознавании собственных и чужих клеток организмом и чужеродных соединений. Располагается на клетках иммунной системы. Некоторые варианты этого белкаочно связываются с белками клейковины, что приводит к хроническому воспалению в слизистой тонкой кишки.*

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.

Содержание глютена в продуктах



Пшеничная каша
3 г



Кукурузная каша



Макароны
3 г



Овёс
2 г



Квас
2 г



Белый хлеб
1,5 г

Высокое содержание глютена

>0,1 г в 100 г



Картофель



Гречневая крупа



Фруктовый сок



Амарантовый хлеб

Низкое содержание глютена

<0,1 г в 100 г

Влияние на организм

Не выявлен риск развития целиакии, возникновение непереносимости глютена маловероятно или не имеет клинического проявления. Однако целиакия является многофакторным заболеванием, и если вы заметили ее симптомы у ребёнка, то рекомендуется пройти дополнительное медицинское обследование.

Рекомендация

У вашего ребёнка не выявлена предрасположенность к целиакии, поэтому вам не нужно исключать из рациона продукты, содержащие глютен: рожь, ячмень, пшеницу, овес, все крупы и изделия из злаков.

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА

LCT

T/T

11%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PROMOTER

MUTATION

MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Лактоза

Лактоза – природный сахар, присутствующий в молочных продуктах.

Результат анализа

Не выявлена предрасположенность к развитию непереносимости лактозы с возрастом.

Непереносимость лактозы



Влияние на организм

Непереносимость лактозы маловероятна.

Симптомы непереносимости лактозы:

- Вздутие
- Тошнота
- Спазмы в животе
- Расстройство пищеварения

Симптомы непереносимости лактозы, при отсутствии предрасположенности, могут свидетельствовать об аллергической реакции на молочный белок.

Для выявления причины обратитесь к специалисту

Рекомендация

Ваш ребёнок может употреблять молоко и молочные продукты без ограничений.

Дошкольный возраст предполагает питание не только дома, но и в детском саду. Если у ребёнка диагностирована аллергия на белок коровьего молока или лактазная недостаточность, предупредите об этом персонал детского учреждения, чтобы исключить молочные продукты из питания ребёнка вне дома.

PROFESSIONAL

Общая информация

В белке молока – казеине, содержатся все необходимые аминокислоты. Молоко богато витаминами группы В, витамином А и D. Это лучший источник кальция и фосфора, также в молоке содержится калий, магний и другие полезные микроэлементы. Как правило, в детстве все пьют молоко, однако с возрастом большинство людей теряет способность его усваивать.

Дело в том, что в состав молока входит молочный сахар – лактоза. Человек не может усваивать её целиком. С помощью фермента лактазы в тонком кишечнике, лактоза расщепляется до усвояемых сахаров: глюкозы и галактозы. В период грудного вскармливания концентрация лактазы в кишечнике находится на высоком уровне, затем у некоторых людей ее концентрация постепенно снижается, а у других остается постоянно высокой. Обычно у детей до 3-х лет самый высокий уровень фермента, к 14-ти годам он полностью снижается. Именно дефицит лактазы приводит к непереносимости молочных продуктов.

При снижении активности фермента возникает лактазная недостаточность – молочный сахар не расщепляется в тонком кишечнике и попадает в толстый. Там под действием бактерий он разлагается с образованием молочной кислоты и газообразных веществ, что приводит к вздутию живота, диарее, рвоте и серьезным воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте.

Результат анализа

Количество фермента, расщепляющего молочный сахар, в норме.

Ген LCT кодирует белок лактазу, который вырабатывается в тонком кишечнике и участвует в расщеплении молочного сахара в кишечнике. Полиморфизм в этом гене приводит к приобретению способности переваривать молоко во взрослом возрасте.

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.

Содержание лактозы в продуктах



Влияние на организм

Ваш ребёнок легко усваивает лактозу и хорошо переваривает молочные продукты. Уровень продукции фермента постоянно высокий, поэтому в зрелом возрасте способность переваривать лактозу сохраняется. Симптомы непереносимости при отсутствии генетической предрасположенности могут свидетельствовать об аллергической реакции на молочный белок.*

Рекомендация

Ваш ребёнок может употреблять молоко и молочные продукты без ограничений. Однако следует помнить, что молоко и молочные продукты содержат большое количество насыщенных жиров. В случае высокой чувствительности к насыщенным жирам рекомендуется потреблять молоко и молочные продукты с низким содержанием жиров.*

*Необходима консультация специалиста - гастроэнтеролога.





Витамины

Витамины – органические вещества, обладают высокой биологической активностью и отвечают за все обменные процессы в организме.

Жирорастворимые – усваиваются только при поступлении в организм вместе с жирами. Имеют способность накапливаться в организме. При избыточном накоплении могут нанести вред. Выводятся в течение одного-двух месяцев.

Водорастворимые – растворяются в воде, часть витамина поступает в кровь, остальное выводится из организма вместе с жидкостью в течение 2-3-x дней.

Некоторые изменения в генах приводят к снижению уровня необходимых витаминов и микроэлементов. В ряде случаев стандартный витаминно-минеральный комплекс не покрывает индивидуальных потребностей.* В отчете рассматриваются витамины, особенно значимые для развития детского организма – D и F (полиненасыщенные жирные кислоты). Дефицит именно этих веществ часто встречается в детском возрасте. Результаты генетического анализа помогут сбалансировать рацион вашего ребёнка витаминами и питательными веществами в соответствии с его индивидуальными потребностями.

D F

Жирорастворимые,
выводятся из организма в течение
1-2 месяцев

Усваиваются только при поступлении в организм вместе с жирами. Имеют способность накапливаться в организме.

*Для расчета индивидуальной нормы потребления витаминов проконсультируйтесь со специалистом.



Резюме

Сбалансированное питание с включением в рацион суточной нормы витаминосодержащих продуктов, позволит вашему ребёнку избежать дефицита или переизбытка витаминов. При необходимости приёма БАД, проконсультируйтесь со специалистом.



Ссылка: Lea R. et al. The effects of vitamin supplementation and MTHFR (C677T) genotype on homocysteine-lowering and migraine disability //Pharmacogenetics and genomics. – 2009. – Т.19. – №. 6. – С. 422-428.

Ambrosone C. B. et al. Manganese superoxide dismutase (MnSOD) genetic polymorphisms, dietary antioxidants, and risk of breast cancer //Cancer research. – 1999. – Т. 59. – №. 3. – С. 602-606.

Major J. M. et al. Genome-wide association study identifies three common variants associated with serologic response to vitamin E supplementation in men //The Journal of nutrition. – 2012. – Т. 142. – №. 5. – С. 866-871.

Jicha G. A., Markesberry W. R. Omega-3 fatty acids: potential role in the management of early Alzheimer's disease //Clinical interventions in aging. – 2010. – Т. 5. – С. 45.

Oussalah A. et al. Helicobacter pylori serologic status has no influence on the association between fucosyltransferase 2 polymorphism (FUT2 461 GA) and vitamin B-12 in Europe and West Africa //The American journal of clinical nutrition. – 2012. – Т. 95. – №. 2. – С. 514-521.

Lietz G. et al. Single nucleotide polymorphisms upstream from the -carotene 15,15'-monoxygenase gene influence provitamin A conversion efficiency in female volunteers //The Journal of nutrition. – 2012. – Т. 142. – №. 1. – С. 161S-165S.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
FADS1

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
C/C

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
16%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 10283T>C

MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT/MUT

Витамин F

Витамин F, в отличие от других витаминов, – не одно вещество, а группа жирных полиненасыщенных кислот, в том числе омега-3.

Результат анализа

Высокая потребность в незаменимых жирных кислотах.

Потребность организма в витамине F

Низкая

Средняя

Высокая

Суточная норма потребления*
1000-2000 мг

Детям дошкольного возраста необходимо включать в рацион растительные жиры, и морскую рыбу – в них содержатся необходимые компоненты для формирования мозга в раннем возрасте.

Влияние на организм

Высокий риск дефицита витамина F.

*Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

Дефицит:
Сухость кожи (экзема, дерматит, псориаз)
Снижение эластичности кожи
Обострение аллергических реакций
Болезнь Альцгеймера
Перхоть

Избыток:
Изжога
Обострение аллергических реакций
Увеличение массы тела
Снижение вязкости крови

Рекомендация

Для профилактики дефицита витамина F необходимо добавить в ежедневный рацион вашего ребёнка продукты, богатые витамином F: красную рыбу, грецкие орехи, тыквенные семечки.

Суточная норма в продукте (на выбор)	Льняное масло	Грецкие орехи	Красная икра	Тыквенные семечки	Скумбрия	Горбуша
	6 г	28 г	44 г	55 г	110 г	120 г

Общая информация

PROFESSIONAL

Витамин F, в отличие от других витаминов, – не одно вещество, а группа жирных полиненасыщенных кислот, в том числе Омега3. Главная из них – линолевая кислота, затем идут линоленовая и арахидоновая жирные кислоты. Витамин F выполняет много функций. Он отвечает за эластичность клеточных мембран, процессы регенерации и усвоение организмом кальция и питания клеток мозга. Жирные полиненасыщенные кислоты, содержащиеся в витамине, незаменимы для здорового развития ребёнка. Они важны для развития мозга в раннем возрасте, и необходимы для формирования гормональной системы у подростков. Поэтому холестерин для детей, особенно "хороший", очень полезен, так как недостаток полиненасыщенных кислот может привести к отставанию в развитии и снижению иммунитета.

Влияние на организм

Высокий риск дефицита полиненасыщенных жирных кислот, недостаток может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению питания мозга.

Результат анализа

Низкая усвояемость растительных источников полиненасыщенных жирных кислот. Ген FADS1 кодирует десатуразу жирных кислот, катализирующую реакцию синтеза арахидоновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты из омега-3 и омега-6 предшественников. Полиморфизм в этом гене связан со снижением уровня омега-3 жирных кислот, увеличением уровня омега-6 жирных кислот и концентрации транс-ненасыщенных жирных кислот.

Рекомендация

Вашему ребёнку рекомендуется увеличить в рационе количество продуктов, богатых витамином F. Суточную норму можно восполнить, съедая каждый день порцию красной рыбы (120-150 г) или горсть грецких орехов. Рекомендован дополнительный прием биологически активных добавок, содержащих омега-3.*

*Перед применением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН

VDR

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

A/A

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА

11%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 283G>A

MUTATION

MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: MUT / MUT

Витамин D

Витамин D – жирорастворимый витамин, необходим для формирования костей и волос

Результат анализа

Высокая потребность в витамине D.

Потребность организма в витамине D

Низкая

Средняя

Высокая



Суточная норма потребления*

500 МЕ

В детском возрасте происходит активный рост костей. Витамин D важен для формирования опорно-двигательной системы, поэтому следует не допускать дефицита в нём. Для этого ребёнку необходимо чаще бывать на солнце и получать достаточное количество витамина из пищи.

Влияние на организм

Высокий риск дефицита витамина D.

Дефицит:

Выпадение волос
Хрупкость костей
Ломкость ногтей
Мышечные спазмы

Избыток:

Снижение аппетита
Повышение давления
Головная боль
Камни в почках

Рекомендация

Необходимо добавить в рацион ребёнка жирные сорта рыбы, яичный желток, грибы. Для профилактики дефицита ребёнок может съедать порцию скумбрии/сельди (200 г) раз в неделю или принимать витамин D курсами.*

*Необходима консультация специалиста

Суточная норма в продукте (на выбор)	Рыбий жир из печени трески	Скумбрия	Форель	Сельдь атлантическая	Яичный желток	Грибы лисички
	4 г	55 г	65 г	35 г	142 г	200 г
Содержание в 100 г	250 мг	18 мг	16 мг	30 мг	7 мг	5 мг

Общая информация

PROFESSIONAL

Витамин D – гормон и жирорастворимый витамин. Основная функция витамина D – обеспечить усвоение поступающих микрэлементов (кальция и фосфора), а также способствовать их отложению в костях. Таким образом, именно от него зависит прочность костной ткани, нормальный рост, правильное формирование скелета и зубов, также он увеличивает сопротивляемость инфекциям, снижает риск развития кожных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Именно поэтому витамин D очень важен для здорового развития детского организма. Витамин D естественно вырабатывается в организме во время нахождения на солнце, а также содержится в некоторых продуктах: жирной рыбе, яичном желтке. Однако получить необходимую суточную дозу только из пищевых продуктов невозможно, поэтому ребёнку необходимо часто бывать на солнце в утренние и вечерние часы и при необходимости дополнительно принимать витамин D.

Влияние на организм

Высокий риск заболеваний, обусловленных дефицитом витамина D.

Результат анализа

Низкая чувствительность рецептора к витамину D.

Ген VDR кодирует рецептор к витамину D, он связан с минеральным обменом веществ, а также участвует в регуляции роста волос и обновлении рогового слоя кожи. Полиморфизм в этом гене связан со снижением чувствительности рецептора и увеличением хрупкости костей, зубов и волос, преждевременному развитию остеопороза и ракита.

Рекомендация

Рекомендуется профилактика витаминодефицита D: необходимо добавить в рацион жирные сорта рыбы и принимать добавки, содержащие витамин D. Дополнительный прием витамина должен быть согласован с педиатром.*

*Перед применением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.



Спортивные показатели

Генетика определяет спортивные качества на 70%, остальные 30% – это результат тренировок. Если ребёнок реализовывает свой потенциал в соответствии с врожденными талантами, то спорт будет приносить ему удовольствие, он будет регулярно им заниматься, что приведет к высоким спортивным результатам. Однако если ребёнок будет заниматься против своих спортивных талантов, то ему потребуется приложить гораздо больше усилий, может появляться желание бросить занятие, и ребенок будет все время переходить из секции в секцию.

Понять врожденные спортивные таланты поможет анализ генов, связанных со спортивными качествами. На способность человека развиваться в определённом виде спорта влияет структура мышечных волокон, уровень кровоснабжения мышц, скорость набора мышечной массы. Эти отличия определяются ДНК, поэтому генетический анализ показывает, в каком виде спорта ваш ребёнок сможет максимально раскрыть свой потенциал, а какой вид физической нагрузки будет способствовать здоровому физическому развитию.

Резюме спорт

Спортивная генетика позволяет подобрать эффективную систему тренировок, рекомендовать подходящий вид нагрузки и их интенсивность для поддержания хорошей физической формы, снижения веса и достижения высоких результатов.

Спортивные качества



Оптимальная физическая нагрузка



Длительность тренировки

50-60 мин + 20-30 мин



Частота тренировок

4-6 раз в неделю



Интенсивность

Высокая



Время суток

Два раза в день

Рекомендация

Вашему ребёнку для здорового роста и физического развития подходят интервальные тренировки высокой интенсивности: интервальные бег и плавание, единоборства.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB2ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/GИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ACEВАШ РЕЗУЛЬТАТ
D/DИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ACTN3ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
C/CИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
PPARGВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: GLY16GARG

NORMA NORMA

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ARG57TER

MUTATION MUTATION

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: PRO19ALAA

NORMA NORMA

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / MUTATION

Спортивный потенциал

Результат анализа

Преимущественно быстрые мышечные волокна



Высокая скорость прироста мышц



Адаптация сердечно-сосудистой системы к силовым нагрузкам



Предрасположенность к высокому пульсу покоя



Сила



Скорость



Выносливость



Низкая

Высокая

Рекомендация

Предрасположенность к развитию силы и скорости.

Общая информация

В генах заложен спортивный потенциал человека. Спортивная генетика поможет выбрать спортивное направление, подобрать рациональный и эффективный режим тренировок, скорректировать диету, а так же избежать травм и заболеваний, которые могут быть вызваны неподходящим видом спорта. Для родителей – это отличная возможность выбрать спортивную секцию для ребёнка, в которой он будет с удовольствием заниматься и добьётся высоких результатов. Полученная информация позволяет подобрать эффективную систему тренировок, рекомендовать наиболее подходящие нагрузки и улучшить спортивные результаты.

Заключение

На основе результатов генетического анализа было выявлено, что у вашего ребёнка: высокий показатель развития силовых способностей (маркеров: 6 из 6), высокий показатель развития скоростных способностей (маркеров: 2 из 2), низкий показатель развития выносливости (0 из 4).

Рекомендация

Ваш спортивный потенциал: «Взрывная сила». В связи с быстрым типом мышечных волокон и адаптацией сердечно-сосудистой системы к силовым нагрузкам, вам подходит высокointенсивные нагрузки. Вы можете реализовать спортивный потенциал в тяжёлой атлетике.

Результат анализа гена ADRB2

Нормальный уровень сердечного выброса в покое.

Ген ADRB2 кодирует белок, который взаимодействует с адреналином. Мутация в этом гене уменьшает значения сердечного выброса в покое, что позволяет увеличивать показатели выносливости.

Результат анализа гена ACE

Гипертрофический ответ сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Фактор развития силы.

Ген ACE кодирует белок, который регулирует уровень кровяного давления и ответ организма на физическую нагрузку в виде прироста мышечной массы. В зависимости от формы гена лучше тренируются показатели выносливости и силы

Результат анализа гена ACTN3

Преобладание быстрых мышечных волокон. Фактор развития скорости.

Ген ACTN3 кодирует белок, который участвует в сокращении быстрых мышечных волокон. Мутация в этом гене приводит к снижению скоростных качеств человека.

Результат анализа гена PPARG

Высокий прирост мышечной массы в ответ на физическую нагрузку. Фактор развития силы.

Ген PPARG кодирует белок, участвующий в утилизации жирных кислот и глюкозы в мышцах и жировой ткани. Одна из форм генов способствует увеличению скорости утилизации питательных веществ, эффективному питанию мышц с последующим набором мышечной массы.

Твой вид спорта

100%

Взрывная сила

Тяжелая атлетика.

97%

Быстрота и сила

а) бег: 100, 200, 400 м; 100 с/б, 110 с/б, 400 с/б;
б) прыжки: в длину, тройной;
в) плавание: 50 и 100 м;
г) коньки: скоростной бег 500 м; шорт-трек 500 м;
д) велосипед: спринт, гит 500 м;
е) гребля: байдарка 200 м; каноэ 200 м.

96%

Абсолютная сила

Пауэрлифтинг, бодибилдинг.

94%

Взрывная скорость

а) метание: диска, молота и копья; толкание ядра;
б) прыжки в высоту, прыжки с шестом.

90%

Быстрота и ловкость

Волейбол, бейсбол, фехтование.

86%

Сила, ловкость и гибкость

а) бобслей, санный спорт, скелетон, горнолыжный спорт;
б) акробатика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика;
в) прыжки в воду, прыжки с трамплина;
г) фигурное катание, синхронное плавание.

80%

Силовая выносливость

Гиревой спорт, силовой экстрем

73%

Быстрота, сила, выносливость, ловкость и гибкость

а) баскетбол, водное поло, гандбол, софтбол, футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, хоккей с мячом, регби;
б) современное пятиборье, семиборье, десятиборье;
в) бокс, восточные единоборства.

69%

Сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость

Борьба: классическая, вольная, самбо, дзюдо.

66%

Скоростная выносливость

а) бег: 800 м;
б) велосипед: гит 1 км;
в) гребля: байдарка 500 и 1000 м; каноэ 500 и 1000 м;
г) коньки: 1000 м; шорт-трек 1000 м;
д) плавание: 200 м.

63%

Выносливость, быстрота, сила и ловкость

Большой и настольный теннис, бадминтон.

58%

Выносливость большой мощности

а) бег: 3000 м с препятствиями, 5 и 10 км;
б) биатлон: спринт;
в) велосипед: велошоссе до 50 км; маунтинбайк;
г) коньки 3, 5 и 10 км; лыжные гонки: 5 и 10 км; плавание: 800 и 1500 м.

52%

Выносливость и быстрота

а) бег: 1500 м;
б) велосипед: 3 и 4 км, кросс-кантри;
в) академическая гребля;
г) коньки: 1500 м;
д) лыжные гонки: спринт;
е) плавание: 400 м.

35%

Выносливость умеренной мощности (длинные дистанции)

а) бег: марафон;
б) биатлон: 15 и 20 км;
в) велосипед: велошоссе 50–200 км;
г) лыжные гонки: 15, 30 и 50 км; дуатлон; лыжное двоеборье;
д) плавание: 5, 10 и 25 км;
е) триатлон;
ж) ходьба: 10 и 20 км.

10%

Выносливость умеренной мощности (сверхдлинные дистанции)

а) ультрамарафон 100 км;
б) ходьба: 50 км;
в) плавание: 50 км;
г) велоспорт: велошоссе 200 км и более, многодневные гонки;
д) триатлон «Железный человек»

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB2

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
G/G

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
23%

ИССЛЕДУЕМЫЙ ГЕН
ADRB3

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
T/C

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГЕНОТИПА
20%

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: GLN27GLU

MUTATION MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: TRP64ARG

NORMA MUTATION

В СРЕДНЕМ ПО ПОПУЛЯЦИИ: NORMA / NORMA

Физическая нагрузка

Результат

Пониженная скорость расхода запасов углеводов и низкая эффективность использования жировых запасов во время физических нагрузок.

Скорость разрушения жиров при физической нагрузке



Скорость разрушения углеводов при физической нагрузке



Низкая

Средняя

Высокая

Оптимальная физическая нагрузка



Длительность тренировки

50-60 мин + 20-30 мин



Частота тренировок

4-6 раз в неделю



Интенсивность

Высокая



Время суток

Два раза в день

Рекомендация

Вашему ребёнку для здорового роста и физического развития подходит интервальные тренировки высокой интенсивности: интервальный бег и плавание, единоборства.

Общая информация

PROFESSIONAL

В здоровом теле – здоровый дух. Физическая активность для ребенка – это основа физического развития и здоровья. Отсутствие регулярных физических упражнений может спровоцировать различные заболевания: от простуд до нарушений обмена веществ.

Любая двигательная активность требует энергозатрат, независимо от того, играет ребенок, гуляет или профессионально занимается спортом. Количество затрачиваемой энергии варьируется в зависимости от интенсивности физических нагрузок. Генетический анализ показывает уровень необходимых энергозатрат для ребенка. Кроме того, мы подобрали виды физических нагрузок, подходящие под генотип вашего ребенка. Скорректируйте его физическую активность в соответствии с наследственными возможностями и интересами.

Результат анализа гена ADRB2

Низкая скорость расходования запасов углеводов в ответ на физическую нагрузку.

Ген ADRB2 кодирует белок, который взаимодействует с адреналином. Во время физической нагрузки происходит активация клетки, и запускается реакция расщепления углеводов в клетках человека. Менее благоприятный вариант гена приводит к снижению скорости распада углеводов.

Результат анализа гена ADRB3

Пониженная скорость расходования жировых запасов для энергопотребления во время физических нагрузок.

Ген ADRB3 – кодирует рецептор, который находится на поверхности жировых клеток. Во время физических нагрузок происходит его активация и запускается реакция расщепления жиров в жировой ткани. Менее благоприятный вариант гена приводит к снижению скорости распада жиров.

Тренировки умеренной и низкой интенсивности



Волейбол



Ходьба



Танцы



Езда на велосипеде
(до 16 км/час)



Верховая езда



Настольный теннис



Большой теннис



Ходьба на лыжах



Лёгкий бег



Футбол



Катание на роликах
и скейте



Плавание



Единоборства



Легкая атлетика



Скалолазание



Плавание в стиле
баттерфляй



Бег на лыжах в гору



Интенсивные
велотренировки

Интервальные тренировки высокой интенсивности

Заключение

Пониженная скорость расходования запасов углеводов и низкая скорость использования жировых запасов во время физических нагрузок. Низкая скорость метаболических процессов в ответ на физические нагрузки.

Рекомендация

Организм вашего ребёнка во время физических нагрузок использует запасы жиров и углеводов для производства энергии с низкой интенсивностью. В целом показатели обмена веществ снижены, что требует от вас максимально сознательного включения в физическую активность ребёнка. В силу сниженного уровня включения энергетических запасов в обмен веществ, рекомендуются нагрузки два раза в день, для активного включения запасов углеводов и жиров. Вашему ребёнку рекомендуются интервальные нагрузки высокой интенсивности и средней длительности не менее 30 мин, это обеспечивает высокий уровень адреналина и хорошо стимулирует распад жиров. Это может быть интервальные бег, плавание, единоборства.



Заключение

Мы надеемся, что полученные знания помогут вам и вашему ребенку достичь больших успехов в жизни.

На основе анализа мы составили для вашего ребёнка персональный ДНК-отчет с рекомендациями. Гены не меняются, поэтому полученные результаты будут актуальны в любом возрасте. Мы не прописываем лечение, не диагностируем заболевания и отклонения. Несмотря на то, что вся информация в данном отчете базируется на научных исследованиях, эти данные не должны использоваться вами или другими лицами для диагностики и лечения заболеваний.

Мы подчеркиваем, что отчет носит информационный характер. На основе ДНК-анализа судят о генетически обусловленных особенностях организма. При этом влияние внешних факторов, таких как среда, аллергия, приобретенные хронические заболевания, в ДНК-отчете не учитываются. Следуя рекомендациям из ДНК-отчета, принимайте во внимание индивидуальные особенности организма ребенка, приобретенные заболевания и психологические факторы.

*рекомендации носят общий характер, для подробной консультации необходимо обратиться к специалисту